

## Bruinroes



## Taanroes



## Oranjeroes

Opgemark op lokvalle in Komati, maar nog nie op suikerriet in Suid Afrika nie



# Bruinroes

Blaarvlekke (merke):

- kaneelbruin tot donkerbruin
- tot 20mm lank
- meer prominent nader aan blaarpunt

Spore:

- Bruin wanneer vars
- Gewoonlik aan die onderkant van die blaaroppervlak

Gunstige toestande – koel nagte, warm dae

Blyk voor te kom op jong gewasse (< 6 maande)

# Taanroes

Blaarvlekke (merke):

- oranje tot rooibruin
- grootte soortgelyk aan bruinroes
- meer prominent nader aan die blaarpunt

Spore:

- oranje wanneer vars, oorweldigend
- kom ook voor op bokant van blaaroppervlak

Wil voorkom asof dit bevoordeel word deur koel klam weer

Is waargeneem op suikerriet van alle ouderdomme

# Oranjeroes

Blaarvlekke (merke):

- Oranje tot rooibruin
- tot 4mm lank
- meer prominent naby blaarbasis

Spore:

- oranje wanneer vars
- gewoonlik aan die onderkant van die blaaroppervlak

Bevoordeel deur bedompige, warm toestande

Blyk voor te kom op volwasse gewasse (>6 maande)