

# Bruinroes

Algemene siekte  
in Suid Afrika




# Taanroes

Suidelike Afrika 2008 / 09  
Geen ander berigte buite  
die streek



# Oranjeroes

Waargeneem in Suid  
Afrika in Februarie 2022



# Bruinroes

## Letsels (roes-puisies):

- Donkerbruin tot rooibruin
- Tot en met 20mm lank en 3mm breed
- Meer gekonsentreerd naby die blaarpunt

## Spore:

- Kaneel tot bruin wanneer vars
- Hoofsaaklik op onderste blaaroppervlak.
- Baie selde op die boonste blaar
- Gewoonlik yl

## Riet ouderdom:

- Onder 6 maande

## Gunstige toestande:

- Koel (onder 25°C), mistig of ligte reën, swaar dou, hoë humiditeit.
- Beperk deur temperature hoër as 30°C

## Seisoen:

- Mees algemeen maar nie beperk tot April tot Junie, Augustus tot September / Oktober

# Taanroes

## Letsels (roes-puisies):

- Donkerbruin tot rooibruin, moontlike verpersing rondom die rand.
- Tot en met 20mm lank en 3mm breed
- Meer gekonsentreerd naby die blaarpunt

## Spore:

- Helder oranje wanneer vars
- Die mees volopste op die onderste blaaroppervlak. Algemeen op die boonste blaaroppervlak.
- Volop, maklik oordraagbaar na klere en vel

## Riet ouderdom:

- Alle ouderdom
- Blare van jong plante naaste aan die grond word dikwels die ergste geraak

## Gunstige toestande:

- Koel (15 tot 23°C), mistig of ligte reën, swaar dou, hoë humiditeit.
- Beperk deur temperature hoër as 30°C

## Seisoen:

- Mees algemeen maar nie beperk tot April tot Junie, Augustus tot Oktober

# Oranjeroes

## Letsels (roes-puisies):

- Oranje tot oranjebruin tot rooibruin
- Tot en met 4 mm lank en 0.5mm breed
- Dikwels meer ernstig in die middel van die blaar, kan strek tot by blaarpunt
- Kan verwarring word met skade van die Geel suikerriet plantluis (YSA).

## Spore:

- Oranje tot kaneel-bruin
- Hoofsaaklik op onderste blaaroppervlak. Met ernstige besmetting kan dit ook voorkom op boonste blaaroppervlak.
- Relatief volop.

## Riet ouderdom:

- Alle ouderdom

## Gunstige toestande:

- Warm, nat, hoë humiditeit
- Beperk deur temperature hoër as 30°C

## Seisoen:

- Mees algemeen maar nie beperk tot Desember tot Mei