

MPUMALANGA VOORLIGTING NUUSBRIEF

Komatipoort

MARIUS ADENDORFF

Komatipoort Meule, Squamans Plaas,
 +27 (0)83 655 5011
 marius.adendorff@sugar.org.za



MARIUS ADENDORFF

Malelane

JAN ERASMUS

MCGA Gebou, Mhlati Plaas
 +27 (0)66 114 0656
 jan.erasmus@sugar.org.za



JAN ERASMUS

P&D

KARLIEN TRÜMPELMANN

Laeveld LPD&VCC Kantoor, Mhlati Plaas
 +27 (0)83 335 3846
 karlien.trumpelmann@sugar.org.za



KARLIEN TRÜMPELMANN

Impak van versuiping op suikerriet

Versuiping is 'n gerekende stresfaktor in suikerriet. Dit kom voor wanneer grond oormatig nat is en nie meer water kan absorbeer nie. Dit veroorsaak verskeie oorlewings- en aanpassingsmeganismes binne die plant. Sommige variëteite kan die gevolge van versuiping vir ongeveer 'n week verduur, mits dit gevolg word deur goeie dreinerings. Langer episodes kan aanleiding gee tot ernstige stres en kan rietopbrengs negatief beïnvloed.

Visuele simptome van stres as gevolg van versuiping kan die volgende insluit:

- Die verswaring en verrotting van die wortelstelsel (as gevolg van 'n suurstof-arm grondomgewing).
- Blaarrol en die vergeling en uitdroging van ouer groen blare, dit kan ook na jonger blare versprei (net soos in droogte kan die onvermoë van die wortels om water op te neem en voedingstowwe te vervoer tot tekorte in die plant lei).
- Lugwortelvorming op die stronk (as gevolg van veranderinge in planthormoonvlakke).

Rypmaker besluitneming onder versuipingstoestande

- Onder versuipingstoestande, beperk die gebruik van die PurEst®-toepassing om slegs die brix-gradiënte binne die stingels te bepaal. Steil brix-gradiënte, in kombinasie met lang boonste internodes en 8 of meer groen blare is aanduidings van geskiktheid vir rypmaak.
- Onder versuipingstoestande kan die gebruik van die PurEst®-toepassing aanbevelings om op 'n chemiese rypmiddelbehandelingskeuse te besluit, onbetroubaar wees.
- As gevolg van aansienlike verskuiwings in die balans tussen planthormone word die gebruik van hormonale rypmakermiddels soos Ethephon en trinexapac-ethyl (Moddus® of Tripac®) nie aanbeveel in versuippte gewasse nie.
- Om dieselfde rede word die gebruik van kombinasie-behandelings nie aanbeveel in versuippte gewasse nie.
- Dit beperk die chemiese rypmaker keuse tot fluazifop-p-butiel (bv. Fusilade Forte®, Volley® of Orca®) in versuippte gewasse wat aan die vereiste visuele voorkomskriteria voldoen.



As daar 'n goeie kans is dat die oesdatum vertraag sal moet word, moet bespuiting ook vertraag word en die toestand van die gewas moet kort voor die nuwe spuitdatum heroorweeg word. Dit sal die geskiktheid vir rypmaak bepaal.